


International Fund for Animal Welfare
国际爱护动物基金会




宗旨



- 通过减少对动物的商业剥削，保护野生动物的栖息地以及救助陷于危难中的动物来提高野生和伴侣动物的福利。
- IFAW通过宣传教育动员公众防止虐待动物，积极推行人与动物共同受益、和谐共处的动物福利和保护政策。

减少野生动物贸易
保护野生动物栖息地







工作方式



- 用科研调查支持行动
- 通过救助动物的行动影响政策
- 开展教育, 发动公众, 改变意识



IFAW Beijing Raptor Rescue Center
北京猛禽救助中心




紧急救助动物




中国伴侣动物网
www.ifaw-arc.org.cn

爱护动物 尊重生命

65 领养代替购买，
别让爱变成你的负担

66 我非弃养不可，
绝不喂成流浪狗

67 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

68 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

69 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

70 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

一旦选择，终生负责

71 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

72 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

73 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

74 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

75 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

76 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

77 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

78 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

79 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

80 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

81 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

82 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

83 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

84 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

85 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

86 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

87 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

88 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

89 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

90 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

91 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

92 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

93 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

94 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

95 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

96 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

97 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

98 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

99 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

100 狗狗咬人不能怪狗的手，
可怪主人没有管好狗

做负责任的宠物主人

IFAW
www.ifaw.org

提供技术支持及政策建议

- 提高兽医诊疗水平
- 建议人道政策及其人性化执行
- 帮助救助组织提高效率和能力



IFAW
www.ifaw.org

伴侣动物安乐术

如何做决定和实施

Dr. Kati Loeffler & 葛芮



IFAW
www.ifaw.org

实施安乐术的挑战

- 概念来自西方：Euthanasia (good and easy death)
- 安乐“死”
- 文化、习俗、宗教产生的影响和偏见
- 缺乏做决定的科学依据、经验和方法
- 缺乏实施的药物、经验、方法和标准
- 动物救助组织的困惑







IFAW
www.ifaw.org

减轻动物痛苦是实施安乐术的前提

针对每个动物从三方面衡量：

1. 医学症状
2. 行为问题
3. 监护人职责缺失



安乐术的实施

IFAW www.ifaw.org

减轻动物的身体、生理、心理痛苦是实施安乐术的前提

安乐术实施必须要求:

IFAW www.ifaw.org

- 在从动物失去意识到最后死亡的过程中, 不应让牠感到痛苦、沮丧、焦虑或担忧
- 接触动物的方式将压力、焦虑和疼痛最小化
- 动作敏捷迅速, 最多不超过一分钟
- 保证人员的安全 (接触有疑似狂犬病的犬只时)
- 保证过程是不可逆的 (失去意识、心跳和呼吸停止、身体器官停止条件反射、瞳孔扩张)

动物的保定

IFAW www.ifaw.org

- 动作必须温柔; 将心理压力降至最低
- 保证动物和工作人员的安全
- 接触保定动物时, 远离其他动物
- 绝不在其他有意识的动物面前实施安乐术
- 如果该动物过于焦躁, 可能给自身或他人带来危险时, 可以使用镇静剂以完成保定



实施安乐术使用药物

- 动物在死亡之前必须达到深度麻醉状态（肢体嗯捏无反应，肌肉放松，眼睑无反射）
- 最普通且安全的方式是使用巴比妥酸盐给动物进行过度麻醉（如戊巴比妥纳）
- 或者，在使用其他麻醉药品（如舒泰或异氟醚）使动物进入深度麻醉后使用氯化钾（KCl）或硫酸镁（MgSO₄）使其心跳停止



药物使用注意事项!

- 氯化钾（KCl）或硫酸镁（MgSO₄）**绝对不能单独、直接在神智清醒的动物身上使用**
- 氯化钾（KCl）或硫酸镁（MgSO₄）会给动物造成很大痛苦，**必须在使动物进入深度麻醉后才可使用**
- 凡是不能使动物进入深度麻醉的麻醉药（如乙酰丙嗪、赛拉嗪）都不要使用。



安乐术必须是不可逆的

- 动物完全失去知觉、意识
- 心跳和呼吸停止—使用听诊器听心跳，观察至少5分钟
- 动物停止所有条件反射（触摸眼睑、嗯捏脚趾）
- 瞳孔扩张
- 检查动物的所有生命体征之后确定动物死亡



生命和生命质量之间的选择

- 根据每个动物的具体情况而决定
- 以减轻动物的身体、生理、心理痛苦为前提
- 慎重、理智的决定是对动物生命的尊重

